

ním protrombinového času, není z veřejného pojištění hrazena.

Dalším faktem je již zmíněné riziko tromboembolických komplikací při úplném vysazení antikoagulace, jak vyplývá z některých studií (4–7).

Závěr

Popsané metody ošetření jsou použitelné v každodenní praxi stomatologa. Je jen na každém lékaři, pro kterou variantu se rozhodne. Autoři rozumí obavám praktických lékařů i stomatologů z možného poextrakčního

krvácení. Proto spíše doporučujeme taková ošetření provádět v zařízeních s erudovanými chirurgy, kteří jsou schopni poskytnout nejen dentoalveolární výkon samotný, ale především mají zkušenosti a zázemí pro řešení možných komplikací.

LITERATURA

1. Devani P, Lavery KM, Howell CJ. Dental extractions in patients on warfarin: is alteration of anticoagulant regime necessary? *Br J Oral Maxillofac Surg.* 1998; 36: 107–111.
2. Dewan K, Bishop K, Muthukrishnan A. Management of patients on warfarin by general dental practitioners in South West Wales: continuing the audit cycle. *Br Dent J.* 2009; 206: E8. discussion 214–215.
3. Wahl MJ. Dental surgery in anticoagulated patients. *Arch Intern Med.* 1998; 158: 1610–1616.
4. Akopov SE, Suzuki S, Fredieu A, Kidwell CS, Saver JL, Cohen SN. Withdrawal of warfarin prior to a surgical procedure: time to follow the guidelines? *Cerebrovascular Diseases.* 2005; (19)5: 337–342.

5. Raunso J, Selmer C, Olesen JB, et al. Increased short-term risk of thrombo-embolism or death after interruption of warfarin treatment in patients with atrial fibrillation, *European Heart Journal.* 2012; (33)15: 1886–1892.
6. Wahl MJ. Dental surgery in anticoagulated patients. *Arch Intern Med.* 1998; 158: 1610.
7. Yasaka M, Naritomi H, Minematsu K. Ischemic stroke associated with brief cessation of warfarin. *Thromb Res* 2006; 118: 290.
8. Ringel R, Maas R. „Dental procedures in patients treated with antiplatelet or oral anticoagulation therapy-an anonymous survey,“ *Gerodontology* 2016; 33: 447–452.
9. Erden I, Çakcak Erden E, Aksu T, et al. Comparison of unin-

terrupted warfarin and bridging therapy using lowmolecular weight heparin with respect to the severity of bleeding after dental extractions in patients with prosthetic valves, *Anatolian Journal of Cardiology.* 2015; (16)7: 467–473.

10. Hong CHL, Napeñas JJ, Brennan MT, Furney SL, Lockhart PB. Frequency of bleeding following invasive dental procedures in patients on low-molecular-weight heparin therapy, *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery* 2010; (68)5: 975–979.
11. Chahine J, Khoudary MN, Nasr S. Anticoagulation Use prior to Common Dental Procedures: A Systematic Review, *Hindawi Cardiology Research and Practice* Volume 2019; <https://doi.org/10.1155/2019/9308631>

